DINÂMICA HÍDRICA EM ÁREA DE AGRICULTURA DE CORTE- E-QUEIMA (SLASH - AND - BURN)

Thiago dos Prazeres do Nascimento¹
Lorena Christina Coutinho Moreira²
Laryssa Leal Tenório³
Julia Gonçalves Barros dos Santos⁴
Vitória Nicknig Alexandre⁵
Ana Valéria Freire Allemão Bertolino⁶

RESUMO

A agricultura de corte e queima (*slash-and-burn*), conhecida como coivara, é uma prática tradicional em florestas tropicais, utilizada por agricultores familiares para subsistência. O método envolve o corte da vegetação, queima controlada, plantio diversificado e pousio para regeneração natural. O estudo foi realizado na bacia do rio São Pedro (Nova Friburgo/RJ), com três parcelas: sem cobertura vegetal (SC), plantio de batata-doce com coivara (PL) e pousio de 10-12 anos (PO). Foram analisados escoamento superficial, perda de solo e potencial matricial do solo em profundidades de 15 cm e 40 cm, usando sensores (GMS's). A precipitação foi monitorada por um ano, com pluviômetros, registrando 62 eventos (950 mm). A parcela SC apresentou os maiores valores de escoamento (10.292 L) e perda de solo (2,10 ton/ha), PL e PO tiveram resultados menores (PL: 593,7 L e 0,007 ton/ha; PO: 638,7 L e 0,012 ton/ha). Os potenciais matriciais mostraram drenagem mais eficiente em PL (-12,72 kPa) e PO (-9,70 kPa) do que SC (-4,76 kPa). A agricultura de coivara e o pousio são eficazes na conservação do solo, minimizando impactos erosivos em relação a áreas descobertas.

INTRODUÇÃO

¹ Mestrando do Curso de Geografia da Universidade do Estado do Rio de Janeiro - UERJ, n4scimento.t.p@gmail.com;

² Mestrando pelo Curso de Geografia da Universidade do Estado do Rio de Janeiro - UERJ, lorennauerj@gmail.com;

³ Mestrando do Curso de Ciências Biológicas Universidade do Estado do Rio de Janeiro - UERJ, laryssa.uerj@gmail.com;

⁴ Graduando do Curso de Geografia Universidade do Estado do Rio de Janeiro - UERJ, juliasantos.ffp@gmail.com;

⁵ Graduando do Curso de Geografia Universidade do Estado do Rio de Janeiro - UERJ, vitorianicknigrj@gmail.com.

⁶ Professor orientador: Titular, Universidade do Estado do Rio de Janeiro - UERJ, anabertolino@uol.com.br;

A agricultura de corte e queima, também conhecida como coivara ou *slash-and-burn*, é um dos sistemas agrícolas mais antigos do mundo, praticado principalmente por populações tradicionais em regiões tropicais. Essa técnica envolve uma sequência de etapas cuidadosas: primeiro, no início da estação seca, ocorre a roçada, onde se remove o sub-bosque e árvores menores. Ao fim da seca, faz-se a derrubada de árvores, abrem-se aceiros ao redor da área para conter o fogo; realizando então a queimada controlada, com técnicas para não se tornar um incêndio florestal, para então fazer o plantio (VALVERDE, 1958; DRESSLER et al., 2021).

Após o ciclo de cultivo, o solo entra em período de pousio, essencial para sua regeneração. Como explica MAFRA (1988), o pousio tradicional envolve o cultivo em pequenas áreas (3 a 5 ha.) por 2 a 4 anos, seguido por 10 a 12 anos de descanso. Durante esse período, a vegetação que se regenera, acumula biomassa que, ao se decompor, restaura a fertilidade do solo sem necessidade de insumos externos (OLIVEIRA, 1999).

No entanto, essa prática enfrenta desafios contemporâneos. No Brasil, o Decreto Federal nº 6.660 (BRASIL, 2008) proíbe o corte de árvores com o diâmetro a altura do peito superior a 5 cm na Mata Atlântica. O que na prática reduz os períodos de pousio e compromete a regeneração do sistema (PEDROSO JUNIOR et al., 2008).

A controvérsia em torno dessa técnica muitas vezes surge da confusão entre o fogo controlado da coivara (de baixa intensidade e curta duração) e os incêndios florestais (de alta intensidade). Quando praticada conforme o conhecimento tradicional, com pousios adequados, a coivara pode manter um equilíbrio entre produção agrícola e conservação ambiental. Estudos como os de Are et al. (2009), Bertolino (2021), Mattos et al., (2022) mostram que o sistema bem manejado mantém a fertilidade do solo, sua estrutura física e favorece a sucessão ecológica.

Por outro lado, quando intensificada com pousios curtos, a prática leva à degradação do solo, perda de biodiversidade e emissões de carbono. Trabalhos como os de Fearnside (2005) e Laurance (2014) alertam para esses riscos, especialmente na Amazônia. A solução parece estar no meio termo: como defende Diegues (1996), é preciso reconhecer o papel histórico das populações tradicionais na moldagem das florestas tropicais.

Um aspecto crucial é a relação da coivara com os processos hídricos. Como demonstram Antoneli; Thomaz (2025), a cobertura vegetal pós-queima é fundamental para proteger o solo da erosão causada pelas chuvas. Pesquisas como as de Bertolino et

al. (2015) mostram que áreas em pousio têm melhor infiltração de água e menor erosão comparado com os solos descobertos. Dados de Santos et al. (2022) na Serra do Mar destacam como o padrão de chuvas - com estações bem definidas entre secas e chuvosas - influencia esses processos.

Em escala global, Heinemann et al. (2017) mostraram que a agricultura de corte e queima ainda ocupa cerca de 280 milhões de hectares, principalmente nos trópicos. Apesar das pressões, ela persiste como importante sistema de produção para muitas comunidades. O desafio atual é desenvolver abordagens que reconheçam seu valor cultural e ecológico quando bem praticada, ao mesmo tempo que mitiguem seus impactos quando mal manejada. Isso requer políticas diferenciadas que considerem contextos locais e apoiem os agricultores no manejo sustentável do fogo e do solo.

METODOLOGIA (OU MATERIAIS E MÉTODOS)

A pesquisa foi realizada na Estação Experimental do Campus de São Pedro da Serra, vinculada ao LABGEO/UERJ-FFP, localizada no município de Nova Friburgo (RJ), dentro da APA Macaé de Cima (coordenadas: 22°18'52.01"S, 42°20'04.22"O), na região hidrográfica de São Pedro da Serra, Serra do Mar (Fig. 1). A área de 64,5 km² possui altitude média de 700m e solo predominante classificado como Cambissolo Háplico de textura franca (46% areia, 28% argila, 26% silte).

A área está inserida no bioma Mata Atlântica, em fitofisionomia de Floresta Ombrófila Densa Montana. Com coberturas florestais contínuas de 500 a 1.500 m de altitude, em áreas de cumeada do relevo dissecado (COSTA *et al.*, 2021). O clima da região é classificado como Cwb (Subtropical de Altitude) com invernos pouco úmidos e verões suaves (EMBRAPA, 2001). A temperatura média varia entre 20,3-21,2°C no verão e 14,1-15,3°C no inverno. A precipitação anual é de 1.279,8 mm, com estação chuvosa concentrada entre novembro e março e seca de maio a agosto, marcando uma clara distinção sazonal (SANTOS *et al.*, 2022).

Fig. 1: Mapa de localização da Estação Experimental de Erosão (EEPE/SPS) do distrito São Pedro da Serra, Rio de Janeiro – Brasil

15º SIMPÓSIO NACIONAL DE GEOMORFOLOGIA

Fonte: Nascimento, 2023.

Localizada no Planalto e Escarpas da Serra dos Órgãos, a área apresenta relevo acidentado e íngreme. Os solos predominantes são Neossolos Litólicos, Latossolos Vermelho-Amarelos e Cambissolos Háplicos (CARVALHO FILHO et al., 2000), refletindo as características geológicas locais.

O estudo utiliza como método, o monitoramento de três parcelas de erosão (Fig. 1): Sistema abandonado de corte/queima/pousio de 10-12 anos (PO); Sistema sem cobertura vegetal (SC) e Sistema de Plantio com Coivara (PL). As parcelas têm chapas de alumínio galvanizadas, com um total de 88 m² de área, cada parcela de erosão possui uma caixa d'água (1000L) conectada no final parcela (WISCHMEIER, 1976). Foram instalados três pluviômetros em cada parcela (Fig. 2). Eles possuem abertura de 100 mm de diâmetro, estão 1,5 m da superfície, evitando as gotas de chuva que alcançam o solo.

Fig. 2: Pluviômetros instalados nas parcelas de erosão

Fonte: Nascimento, 2023.

Em todas as parcelas foram instalados sensores de matriz granular, sensor watermark (GMS's) em respectivas profundidades de 15 e 40 cm. Todos sensores foram

testados em laboratório para atestar a sua acurácia. ara a instalação dos sensores utilizou-se um trado manual de rosca com 120 cm afim de realizar a perfuração (Fig. 3).

Fig. 3: Testes e instalação dos sensores: A) sensores sendo testados em laboratório; B) perfuração do solo com auxílio do trado manual de rosca 120 cm ;C) os mesmos sendo instalados em campo.

Fonte: Nascimento, 2023.

O plantio de batata-doce (*Ipomoea batatas*) foi realizado em outubro de 2022 na parcela de erosão (PL) e colhido em agosto de 2023 (Fig. 4).

Fig. 4: Plantio e colheita da batata-doce (*Ipomoea batatas*). Na figura A) plantio sendo realizado em espaçamentos aproximado de 80 cm entre as leiras com uma média de 30 cm a 40 cm de altura e com 25 cm espaçamento entre as raízes. B) colheita.

Fonte: Nascimento, 2023.

O monitoramento das parcelas erosivas é conduzido diariamente às 9h, sendo as amostras transportadas para o Laboratório de Geociências (LABGEO) da UERJ/FFP. A supervisão do escoamento superficial foi realizado diariamente, coletando-se a água e os sedimentos retidos na caixa coletadora. Após a coleta, o volume total foi mensurado utilizando baldes graduados, com registro sistemático dos dados em planilha de monitoramento mensal.

A quantificação das perdas solo foi realizada coletando-se alíquotas do recipiente calibrado da caixa coletora (BERTONI; LOMBARDI NETO, 2017.). No laboratório, as amostras são acondicionadas em béqueres de 1 l e submetidas à secagem em estufa a 110°C. Após a secagem, determina-se a quantidade de sedimento através da pesagem em balança de precisão, subtraindo-se a tara do béquer vazio do peso total do béquer com sedimento depositado (Fig. 5).

Fig. 5: Amostras triadas em laboratório. A) Alíquotas (1L) colocados na estufa para secar em uma temperatura máxima de 110°C; B) Sedimento seco e pronto para ser quantificado.

Fonte: Nascimento, 2023.

RESULTADOS E DISCUSSÃO

Durante o período de plantio e colheita, ocorreu um total de 62 eventos de chuva, totalizando 950 mm, durante outubro de 2022 a agosto 2023. Diariamente, a cada 24h, os dados foram aferidos e o total pluviométrico foi anotado. Foram registrados 60 dias de chuva durante esse período. Os totais pluviométricos registrados foram separados em sete classes recomendadas pelo INMET (1992), (Tab. 1).

Tab. 1: Frequência da chuva no período de outubro/2022 a agosto de 2023.

Meses	0,1-2,5 mm	2,5-5 mm	5-10 mm	10-15 mm	15-25 mm	25-50 mm	50-100 mm	Total Mensal
Out/22	-	-	-	2	-	-	-	2
Nov/22	-	2	5	1	4	2	-	14
Dez/22	-	-	2	2	4	2	1	11
Jan/23	-	-	1	-	-	-	-	1
Fev/23	-	-	-	2	1	3	-	6
Mar/23	2	3	2	2	-	-	-	9
Abr/23	-	1	3	-	2	2	-	8
Mai/23	-	-	2	2	-	-	-	4
Jun/23	-	-	1	1	1	-	-	3
Jul/23	-	-	2	1	-	-	-	3
Ago/23	-	-	-	1	-	-	-	1
Soma	2	6	18	14	12	9	1	62

Fonte: Os autores, 2025.

Partindo deste ponto relacionado a frequência da chuva e analisando os totais pluviométricos dos meses outubro, novembro e dezembro de 2022 e janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho, julho e agosto de 2023, em relação ao escoamento superficial e perda de solo, a parcela (SC) exibiu valores elevados apresentando 10,292 L e 2,10 ton/ha., enquanto as parcelas (PL) apresentam os valores totais de 593,7 L e (PO) de 638,7 L de escoamento e valores de perda 0,007 e 0,012 ton/ha. respectivamente. (Fig. 6a e 6b).

Fig. 6a: relação chuva (mm) e perda de solo (ton/ha.) das parcelas com sistemas (SC), (PL) e (PO) no período de outubro/2022 a abril/2023. Fig. 6b: relação chuva (mm) e escoamento superficial (L) das parcelas com (SC), (PL) (PO) no mesmo período.

Fonte: Nascimento, 2023

Merat (2014) na mesma área de estudo apontou que as perdas de água e solo indicaram as maiores perdas no sistema SC, o sistema CO e o sistema PO obteve as menores perdas de água e de solo.

O maior escoamento em (PO) 638,7L contra o escoamento em (PL) 593,7L pode estar associado à formação de compostos orgânicos hidrofóbicos na serapilheira, conforme descrito por Coelho Netto (1987). Essa camada superficial reduziria a infiltração, direcionando a água para o escoamento superficial, enquanto o manejo agrícola em (PL) manteria maior permeabilidade do solo.

Antoneli; Thomaz (2025) apontam que a perda de solo foi baixa no sistema que recebeu o fogo de baixa severidade (coivara) em detrimento do sistema que recebeu um fogo de alta severidade (incêndio florestal).

Os sensores começaram a ser monitorados pós-colheita e abrangeram com um total de chuva ~ 743,2 milímetros Fig. 8.

15º SIMPÓSIO NACIONAL DE
GEOMORFOLOGIA

Fig. 8: Relação chuva (mm) e médias dos potenciais matriciais (kPa) 15 cm e 40 cm das Plantio (PL), Sem Cobertura (SC) e Pousio (PO).

Fonte: os autores.

Imediatamente após os eventos de chuva, os valores do potencial matricial no gráfico inferior aproximam-se de 0 kPa, indicando um aumento da umidade do solo. Em contrapartida, nos períodos sem precipitação, o potencial matricial torna-se mais negativo (com as linhas descendentes), o que evidencia a gradual secagem do solo. Os resultados das médias totais dos potenciais matriciais, nas profundidades 15 cm e 40 cm, demonstraram que o manejo (PL) (-12,72 kPa) e (PO) (-9,70 kPa) tiveram uma drenagem mais eficiente quando comparado ao sistema (SC) (-4,76 kPa). Na mesma área de estudo Bertolino et al. (2015) e Merat (2014) encontraram resultados semelhantes.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

A agricultura de corte e queima com pousio prolongado mostrou-se mais eficiente que o solo descoberto, reduzindo erosão e escoamento superficial. A vegetação (cultivada ou em regeneração) melhorou a infiltração e a estrutura do solo, indicando que práticas tradicionais, como a coivara, podem ser sustentáveis se bem manejadas.

Palavras-chave: Agricultura de corte e queima, Potencial Matricial, Erosão hídrica.

AGRADECIMENTOS

Agradecemos à Capes pelas bolsas dos alunos Thiago e Laryssa. A FAPERJ pelas Bolsas dos alunos Luiz e Lorena e ao CETREINA-UERJ pelas bolsas das alunas Julia e Vitória

REFERÊNCIAS

ANTONELI, V; THOMAZ, E. L. Effect of fire severity on hydro-erosive processes and black bean (*Phaseolus vulgaris* L.) productivity under slash-and-burn agriculture. **Agriculture, Ecosystems & Environment**, v. 381, p. 109454, 2025.

ARE, K. S.; OLUWATOSIN, G. A.; ADEYOLANU, O. D.; OKE, A. O. Slash and burn effect on soil quality of an Alfisol: soil physical properties. **Soil and Tillage Research**, v. 103, n. 1, p. 4-10, 2009.

BERTOLINO, A.V.F.A. Repercussões da agricultura de corte e queima na hidrologia e na erosão – São Pedro da Serra /Nova Friburgo (RJ). In: VILLAS BOAS, H.G.; MATTOS, C.P. (Ed.) **20 anos da Área de Proteção de Macaé de Cima: trajetórias e caminhos na pesquisa ambiental**. p. 173-220, 2021.

BERTOLINO, A. V. F. A. et al. Dinâmica hidrológica e erosiva em agricultura tradicional de corte e queima no bioma de mata Atlântica (RJ)–Brasil. **Territorium**, n. 22, p. 65-75, 2015.

BERTONI, J.; LOMBARDI NETO, F. **Conservação do solo**. 10a ed. São Paulo: Ícone, 2017. 355 p.

BRASIL. Decreto Federal nº 6.660, de 21 de novembro de 2008. Dispõe sobre a utilização e proteção da vegetação nativa do Bioma Mata Atlântica. Diário Oficial da União, 21 de novembro de 2008. p. 1, col. 2. Disponível em: <https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2007-2010/2008/Decreto/D6660.htm>. Acesso em 2024.

CARVALHO FILHO, A., LUMBRERAS, J. F., SANTOS, R. D. Os Solos do Estado do Rio de Janeiro. In: DANTAS, M. E. et al. **Estudo geoambiental do estado do Rio de Janeiro**. 2. ed. Brasília: CPRM, 2000.

COELHO NETTO, A.L. 1987. Overland flow production in a tropical rain forest catchment: The role of litter cover. **Catena** 14: 213-232.

COSTA, K.K.S. et al. Regeneração da cobertura vegetal em área de agricultura de corte e queima em São Pedro da Serra, Nova Friburgo (Rio de Janeiro, Brasil) **Revista Tamoios**, São Gonçalo, v. 17, n. 2, p. 84-110, 2021. Disponível em: <https://doi.org/10.12957/tamoios.2021.58517>. Acesso em: 12 jun. 2025.

DIEGUES, A. A. **O mito da natureza intocada**. São Paulo: Editora HUCITEC. 1996.

DRESSLER, W. H. et al. Recalibrating burdens of blame: Anti-swidden politics and green governance in the Philippine Uplands. **Geoforum**, v. 124, p. 348-359, 2021.

EMBRAPA – **Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária**. Clima, 2001.
Disponível em: <http://www.cnpf.embrapa.br/pesquisa/efb/clima.htm>. Acesso em 17 mar. 2025.

HEINIMANN, A. et al. A global view of shifting cultivation: Recent, current, and future extent. **PloS one**, v. 12, n. 9, p. e0184479, 2017.

INMET - **INSTITUTO NACIONAL DE METEOROLOGIA DO BRASIL**. Normais Climatológicas (1961/1990). Brasília -DF, 1992.

LAURANCE, W. F.; SAYER, Jeffrey; CASSMAN, Kenneth G. Agricultural expansion and its impacts on tropical nature. **Trends in ecology & evolution**, v. 29, n. 2, p. 107-116, 2014.

MAFRA, R. C. **Ciências agrárias nos trópicos brasileiros: agricultura tropical, agroecossistemas tropicais**. Brasília: MEC, 1988. 87p.

MATTOS, B. S.; BERTOLINO, A. V. F. A.; BERTOLINO, L. C. A influência do fogo nas propriedades de um solo sob manejo de agricultura de corte e queima em ambiente serrano no bioma de Mata Atlântica. **Sociedade & Natureza**, v. 34, e63656, 2022.

MERAT, G. S. **Análise da dinâmica da paisagem sob utilização de coivara em bioma de mata atlântica – Estação experimental de pesquisa de erosão em São Pedro da Serra – Nova Friburgo/RJ**. Dissertação (Mestrado em Geografia) - Faculdade de Formação de Professores, Universidade Estadual do Rio de Janeiro. São Gonçalo, 2014.

OLIVEIRA, R. R. **O rastro do homem na floresta: sustentabilidade e funcionalidade da Mata Atlântica sob o manejo caiçara**. Tese de Doutorado. IGEO/UFRJ. Rio de Janeiro. 150p. 1999.

PEDROSO JÚNIOR, N. N.; MURRIETA, R. S.; ADAMS, C. A agricultura de corte e queima: um sistema em transformação. **Bol. Mus. Para. Emílio Goeldi. Ciênc. hum. [online]**, v. 3, n. 2, p. 153-174, 2008.

SANTOS, S. A. F. et al. caracterização da precipitação a partir da técnica dos quantis e da frequência de chuva durante o período de 2006 a 2022 em são pedro da serra – município de nova friburgo (Rj). **Revista Tamoios**, São Gonçalo, v. 20, n. 1, 2024. DOI: 10.12957/tamoios.2024.75573. Disponível em: <https://www.e-publicacoes.uerj.br/tamoios/article/view/75573>. Acesso em: 7 jul. 2025.

WISCHMEIER, W. H. Rainfall energy and its relationship to soil loss. **American Geophysical Union Transaction**, Washington, v. 39, n.5, p. 285-291. 1976.